

TESTUDO PARDALIS, *Bell.*

Testâ flavâ, nigro aspersâ; scutis sulcatis, scutorum costalium areolis prope marginem superiorem positis; scuto nuchali nullo; femore utrinque scutis binis, magnis, conicis, armato.

Testudo pardalis. Bell, Zool. Journ. III. tab. sup. XXV. p. 421.—Gray, Syn. Rept. p. 12.
Junior. Gray, l. c. tab. iii.
? Pullus. Sebæ Thes. I. tab. lxxix. fig. 3. *Testudo elegans.* Shaw, Gen. Zool. III. p. 49.

Habitat in Africâ australi.
Mus. nostr. Jun. in Mus. Brit.

Descriptio. *Caput* fuscum, flavo obscurè nebulosum, elongatum, squamis plurimis rotundatis tectum, quarum superiores multò majores. *Maxillæ* denticulatæ. *Irides* fuscæ. *Collum* longissimum, flexile, fuscum, posticè flavescens, squamis minutis undiquè tectum. *Pedes antici* fusci, squamis magnis, lanceolatis, imbricatis, flavescentibus, defensi. *Ungues* longi, angusti. *Pedes postici* fusci, squamis lutescentibus, quarum quædam planæ, hexagonæ; aliæ, ad calces positæ, lanceolatæ, gibbosæ. *Femora* squamis similibus defensa, quarum utrinquè duæ magnæ, fortissimæ, conicæ. *Ungues postici* angusti, longissimi. *Cauda* brevis, conica, tuberculata. *Testa* ovata, supra femora expansa, altè fornicata. *Scuta* sulcata, flava, maculis numerosis irregularibus, nigris, radiatim aspersa; areolis sordidè flavis: *vertebralia* gibba, areolis centralibus; primum pentagonum, latum; secundum hexagonum, anticè angustius; tertium transversè hexagonum; quartum hexagonum, posticè angustius; quintum subhexagonum, gibbosum, posticè dilatatum: *costalia* plana, lata, ferè quadrata, areolis prope marginem superiorem positis: *marginalia* lata; anteriora expansa, porrecta; lateralia quadrata, infrà rotundata; posteriora prominentia. *Scutum nuchale* nullum; *caudale* latè pentagonum, gibbosum incurvum. *Sternum* flavum, maculis nigris radiatis, planum, anticè leviter sinuatum emarginatum, angustum; *scuta gularia* porrecta, angusta: margo posterior profundè lunato-emarginatus.